

DIPLÔME NATIONAL DE DOCTORAT

(Arrêté du 25 mai 2016)

Date de la soutenance : **25 juin 2024**

Nom de famille et prénom de l'auteur : **Monsieur CHAPPUY Mathieu**

Titre de la thèse : « *La réduction des risques : Évaluations et utilisation de la naloxone, de la buprénorphine long-acting, des salles de consommations et des prescriptions de prégabaline* »

Résumé



L'addiction est un trouble comportemental se manifestant par la répétition envahissante de comportements en lien avec l'obtention d'une récompense et/ou d'un plaisir ou d'un soulagement. Ces comportements concernent fréquemment l'usage de substances psychoactives. L'une des avancées les plus significatives dans le domaine de l'addictologie « moderne » réside dans la reconnaissance de l'importance de l'inclusion active des patients/usagers de drogues dans leur propre prise en charge.

L'objectif principal de mon travail a été d'explorer et d'évaluer les attentes et besoins des usagers sur différents aspects : la naloxone, la buprénorphine long acting, les salles de consommation à moindre risque et les prescriptions de prégabaline.

Pour ce faire, plusieurs études auprès des professionnels du champ addictologique, et des patients/usagers de drogues ont été menées. Ces études ont permis entre autres d'évaluer le taux d'usage de la naloxone dans les overdoses aux opioïdes et la préférence des patients (y compris incarcérés) vis à vis d'une nouvelle forme injectable à longue durée d'action de buprénorphine. Concernant la salle de consommation à moindre risque, l'étude visait à recueillir l'opinion des usagers et identifier les profils des usagers les plus intéressés. Enfin, concernant la prégabaline, la première étude a mis en évidence un profil de mésuseurs et la seconde a évalué l'impact d'une modification réglementaire concernant sa prescription.

En abordant ainsi ces quatre sujets, on montre de manière originale une cartographie française sur l'organisation des soins et de la réduction des risques pour les usagers/patients souffrants d'un trouble d'usage des opioïdes et/ou de prégabaline.

Mot clés : Addictologie, réduction des risques, naloxone, buprénorphine, salle de consommation à moindre risque, prégabaline.